

Ghẻ là bệnh có tổn thương xuất hiện nhiều ở các vùng mà điếu thuốc sinh thực phẩm kém, tiếp xúc sinh hoạt tiếp xúc. Bệnh lây lan nhanh do ký sinh trùng ghẻ lan truyền từ người này sang người khác qua tiếp xúc, dùng chung quần áo, giày dép, chăn, màn. Bệnh phát triển nhiều vào mùa đông, tuy không dễ lây nhiễm qua người, song nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống.

Đôi nét về ký sinh trùng ghẻ

Hình bầu dục, ghẻ cái dài 0,3 – 0,5mm, màu trắng đục; có 4 đôi chân, hai đôi chân trước có kèm theo các móng vuốt hút, hai đôi chân sau có các sợi lông dài để di chuyển. Ký sinh trùng ghẻ đào hang tiếp xúc, đẻ trứng, qua chu kỳ 20 ngày thành ký sinh trùng ghẻ. Sinh sản nhanh trong điếu thuốc lá, sau 3 tháng mới ký sinh trùng ghẻ cái có thể sinh sản ra một đống hàng 150 triệu con.

Biểu hiện của bệnh

Giai đoạn ban đầu: Người là triệu chứng chính, làm bệnh nhân không thể chịu được và đi khám bệnh. Thông thường xuất hiện sau khi lây bệnh khoảng một tuần, ngứa ít vài ban ngày, ngứa nhiều về đêm.

Giai đoạn về sau: Khi các thông tin đã xuất hiện đầy đủ bao gồm:

Vị trí tổn thương đặc biệt: Kẽm ngón tay, kẽ ngón tay, cùi tay, bờ trước nách, quanh rốn, nếp gấp nếp, chân, sinh dục ngoài... Cần nam giới cần chú ý bao quy đầu, nữ giới cần chú ý vú, nhất là quanh núm vú, trẻ em cần chú ý đến lòng bàn chân.

Viết bởi linhnc

Thứ năm, 10 Tháng 9 2009 15:27 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 09 Tháng 2 2010 12:54

