



Đau bụng là một trong những lý do khiến các bậc cha mẹ đón con mình đến bệnh viện nhanh nhất. Vì vậy đánh giá một cơn đau dài có thể là một thử thách cho cả cha mẹ lẫn thầy thuốc.

Những nguyên nhân gây đau bụng ở trẻ em có thể thay đổi mặc dù không quan trọng đến đặc điểm của chúng như biểu hiện ra ngoài có thể khác nhau một chút. Tuy nhiên, có một điều may mắn là những cơn đau bụng của trẻ thường sẽ đặc biệt chỉ diễn ra rất nhanh chóng. Vì vậy khó khăn cho cha mẹ và các bác sĩ là việc phân biệt đâu là những biểu hiện hiện có phản ứng với cơn đau, đâu là những biểu hiện không phản ứng với nó.

NGUYÊN NHÂN

- Nhím trùng:** nhím virus hoặc vi trùng đều có thể gây đau bụng nhưng chúng ta vẫn thường hay thấy trong các cảm cúm hoặc viêm đường ruột. Nhím virus thường khởi phát nhanh còn nhím vi trùng thì có phản ứng đặc trưng là đau bụng.

- Liên quan đến thức ăn:** ngay trước khi ăn, sau khi ăn, bao giờ cũng có thể gặp

sinh hôi đùu có thể gây căng thẳng và khó chịu kèm theo.

- **Ngộ độc:** tràng họng hoặc mũi có thể thay đổi thành nhức ăn phổi và phòng đỡ nồng độ nhức đầu tột cùng kim loài hoocmôn dùng thuốc giảm đau như Tylenol.

- **Bệnh lý ngoài khoa:** bao gồm viêm ruột thừa và táo ruột

- **Những bệnh lý khác:** có thể nguyên nhân xuất phát từ những vùng không thuộc bìng.

Chứng hàn nhức bụng có thể bao gồm do biến chứng của

đái tháo đường

hay do hen suyễn đục cổ.

TRỊ U CHIẾNG

Thường thì cha mẹ hoocmôn các bộ phận có thể đặc biệt báo động khi trẻ đau bìng. Trẻ nhú nhí và trẻ nhỏ có thể sụt khóc, khuôn mặt biến đổi hiền sụt đau đớn và buồn nôn iITT. Trẻ nhỏ thường sẽ tìm cách thông báo với bạn ngay lập tức nếu họ trong nguy hiểm có điều gì đó thay đổi. Một số trẻ mèo lèn có thể sụt cõi thay đổi miếng cõi ng khi phổi báo với cha mẹ về cảm đau của mình, và khi đó bao gồm phổi hối cho đặc biệt mặt lèi giật thích rõ ràng với những gì chúng đang cảm thấy. Hãy hỏi trẻ những vấn đề sau:

- **Độ dài cảm đau:** điều quan trọng cần nhớ là hầu hết những nguyên nhân gây đau bìng đều không kéo dài quá lâu. Hầu hết những nguyên nhân trong chúng ta mèo khi bị đau do đầy hơi thì cảm đau thường sẽ khởi sau 12 - 24 giờ. But khi cảm đau nào kéo dài hơn 24 giờ đều cần phải đặc biệt đi khám bình.

- **Vị trí cảm đau:** hầu hết các cảm đau do những nguyên nhân đặc biệt đều có vị trí xác định rõ ràng. Trẻ sẽ chà xát xung quanh rốn. Nếu các cảm đau xuất hiện ở những vùng khác đòi hỏi mèo có một số chú ý như hàn, đặc biệt là những cảm đau ở khu vực thấp phía dưới bên phổi bìng. Đau ở khu vực đó đặc biệt cho là do viêm ruột thừa cho đến khi có bìng chứng chung minh là do nguyên nhân khác.

- **Bíu hiến cảm đau:** thông thường, nếu nhú trẻ trông có vẻ rát mắt mèo kèm với đáng sợ đặc biệt, bao gồm đặc trưng bùn viền. Hầu hết các cảm bao gồm cảm giác đau ở vùng bụng có vẻ rát mắt mèo. Những những đặc biệt hiến cảm đau có thể là do tái nhút, vã mồ hôi hoặc trẻ cảm thấy buồn nôn hoặc hoocmôn.

- **Nôn ói:** đặc biệt này xảy ra cùng với đau bìng khá thường xuyên, nhưng nôn ói không luôn luôn là biểu hiện của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình diễn tiến có thể là mèo, hầu hết những nguyên nhân đặc biệt gây nôn thường sẽ khởi đầu nhanh chóng. Cần nhớ một quy luật là nếu nhú nôn ói kéo dài trên 24 giờ thì đó là lý do chính đáng để gọi cho bác sĩ.

- **Tính chất nôn:** đặc biệt nhú nhí và trẻ nhú, nếu cảm nôn có màu xanh hoocmôn vàng thì bìng nên đặc biệt khám. Đặc biệt đặc điểm nào, nếu cảm nôn có chất màu hoocmôn nhúng chất màu đen thì nên đặc biệt phòng cấp cứu gấp.

- **Tiêu chảy:** triệu chứng này cũng thường hay gặp kèm với đau bụng và thường là một biến hiện cho thấy virus chính là nguyên nhân gây bệnh. Có thể tiêu chảy trong khoảng 1 tuần nhưng thường kéo dài ít hơn 72 giờ (3 ngày). Nếu có máu trong phân thì cần nên đến bác sĩ để khám bệnh ngay.
- **Sốt:** sốt không phải lúc nào cũng là biểu hiện của tình trạng bệnh nặng. Thử ra thì có thể thấy những trường hợp nguyên nhân gây đau bụng là những bệnh nặng hơn như nhiễm trùng đường hô hấp.
- **Đau háng:** có một vấn đề khá quan trọng là những trường nam có thể sẽ nói rằng chúng bị đau bụng nhưng thực ra là chúng đau ở vùng nào đó khác. Ở bệnh nhân xoắn tinh hoàn, là tình trạng tinh hoàn xoắn lồi xung quanh chính nó và ngăn không cho máu đến nuôi. Trong có thể cảm thấy xuất hiện khi nhận định rõ trí đó, do đó cần nêu rõ có phái chúng đau ở "phía dưới" hay không. Vì vậy đây có thể là dấu hiệu đặc trưng của phát hiến sớm. Do đó, nếu thấy đau ở khu vực háng hoặc tinh hoàn, hãy đến khám bệnh.
- **Bệnh đột ngột niêm:** đau bụng có thể liên quan đến những bất thường khi đi tiểu, những tiếng đau hoặc tiểu lần nhặt, có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng và là lý do để đến khám bác sĩ.
- **Phát ban:** có một số nguyên nhân nghiêm trọng gây đau bụng xảy ra cùng với phát ban. Nếu thấy phát ban kèm với đau bụng thì nên liên hệ với bác sĩ ngay.

KHÁM & XÉT NGHIỆM

Đau bụng | truem do một số nguyên nhân, như hưng động các hố cống quan khác nhau, mót hố cống phái có một số thông các xét nghiệm và các khám để chẩn đoán khác nhau. Các bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân và thăm khám, có thể bao gồm kiểm tra trực tràng để xem có máu hay không. Tuy nhiên thông tin trên, các bác sĩ có thể sẽ thực hiện tiếp những xét nghiệm khác.

- Có thể bác sĩ sẽ phái lấy máu để gửi đến phòng xét nghiệm để làm công thức máu, kiểm tra cholesterol, triglyceride, glucose, amylase/lypase. Bác sĩ cũng có thể sẽ lấy mẫu nước tiểu để phân tích và kiểm.
- Một mẫu phân cũng có thể được lấy để kiểm tra xem có máu, vi khuẩn hay ký sinh trùng bên trong hay không.
- Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh (X quang và những loại khác liên quan) có thể sẽ được dùng để kiểm tra vùng bụng.
- Số đông siêu âm để xác định bệnh/tinh hoàn
- Số đông CT scan để xác định
- Một số phim ảnh kỹ thuật tra để xác định khác cũng có thể được làm để xác định tình trạng cống, bao gồm chụp hình có bộ máy hoặcультразвуком, đo áp lực lưu thông trong khung chậu.

- Trẻ cũng có thể sẽ đặc chuyén đến các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa hoặc các bác sĩ ngoại khoa đặc biệt thích hợp.

ĐIỀU TRỊ

Tại nhà

Cha mẹ và bạn bè nên theo dõi sát trẻ và liên hệ với nhân viên y tế để đặc biệt giúp đỡ những thời điểm thích hợp. Theo dõi trẻ chặt chẽ đặc biệt là vào giai đoạn phổi hơi cho đến khi trẻ cảm thấy khỏe hơn. Những trẻ mới lớn có thể sẽ không muốn bị làm phiền nhưng cũng cần phải đặc biệt theo dõi.

- Nghỉ ngơi: trẻ đang bị đau bụng thường sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nghỉ ngơi. Nên úp mặt có thể sẽ làm giảm đau do đầy hơi, nhưng tốt nhất là tự làm cho trẻ cảm thấy dễ chịu nhất.
- Ăn uống: con người có thể sẽ không đặc biệt trong một thời gian dài không ăn nhưng cần phải uống nước đủ duy trì sự sống. Số mặt nước cần phải có thời gian để lâu đài nhau để nồng độ nồng độ, do đó việc bù đắp không phải lúc nào cũng cần thiết. Một trẻ đang bị nôn sẽ không thể giữ mặt lỏng lẻo nước. Các bác sĩ khuyên rằng nên cho trẻ uống mặt lỏng nước nhỏ mỗi 15 đến 20 phút cho đến khi trẻ có thể uống nhuộm hơi.
- Löi dịch cặn chất: không nên cho nước hoocmida đặc đặc đun sôi cho trẻ vì có thể sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về lỏng lẻo như muối trong cơ thể. Các bác sĩ khuyên dùng nước loãng đặc đặc khác nhau, như Pedialyte (bạn có thể mua ở nhà thuốc mà không cần toa). Cơ thể sẽ吸收 nước và đặc đặc càng sớm càng tốt. Lỏi chán tốt nhất cho những trẻ lỏng lẻo bao gồm nước ngọt hoocmida nước súp thịt. Tránh uống sữa, nước ép trái cây, đặc đặc chua carbonated nước, cafe, và nước uống thể thao (như Gatorade) vì những bài thuốc nhân bì tiêu chảy vì ruột có thể sẽ không dung nạp đặc đặc chúng. Nếu những trẻ lỏng lẻo đòi uống nước nhỏ, tránh dùng nước thay thế có cafe.
- Thức ăn đặc: trẻ sẽ cho bạn biết lúc nào là thời điểm thích hợp để dùng thức ăn đặc. Bắt đầu với cháo, ban đầu hãy cho trẻ ăn bánh mì mặm - và chuyển sang những thức ăn thường ngày nếu chúng dung nạp với thức ăn. Chuẩn và cảm cũng là những thức ăn thích hợp sau một giai đoạn kiêng cữ.
- Thuốc: bạn có thể dùng acetaminophen ([Aspirin](#) Free, Children's Silapap, Panadol, Liquiprin, Tylenol) để giảm sốt. Hãy hỏi các bác sĩ về tránh dùng aspirin trên trẻ em. Tránh dùng kháng sinh trẻ khi có chỉ định của bác sĩ. Các bác sĩ cũng không khuyên dùng những loại thuốc tẩy chảy nước hoocmida phế quản thuốc gia truyền khác. Nếu bạn dùng chúng trước khi đến gặp bác sĩ, hãy chắc chắn kể lại những gì bạn đã cho trẻ dùng, do chúng có thể ảnh hưởng đến việc điều trị.

Điều trị

Vิธีดูแลสุขภาพที่นิยม hànhส่วนบุคคล, khámลâm sàng, kết quả các xét nghiệm, và trên cá nhân mỗi个人. Có thể việc điều trị chủ đề này là cho trẻ em nhà và hàng dònghayngười, bù đuch, ăn kiêng. Tuy nhiên, việc điều trị cũng có thể bao gồm cả nhophilip và phu thuât.

TIỀN LỘNG

Tiền lồng cung cấp triều chuồng đau bìng ở trán thay đổi tùy theo nguyên nhân gây ra chúng. Hỗn hợp các tráng hophilip đau bìng như đệm điều trị sùm sùm cho tiền lồng tốt, tuy nhiên nếu đau bìng không đượcc chẩn đoán và điều trị có thể sẽ gây nguy hiểm đòn tính mang. Do đó, vào giai đoạn sớm cung cấp bùn, các bùc cha mèn hỗp tác tốt với bác sĩ nhi khoa và bùn vien đabo đòn tròn nhưn đệm sùm chăm sóc tốt nhất.

Theo emedicinehealth - Y học NET đúc