


Ectopic pregnancy



ADAM

Thai ngoài tử cung là tình trạng thai phát triển bên ngoài tử cung, xảy ra khi trứng đã đính cùnghình với buồng trứng không làm tảo vào đúng vị trí bình thường ở tử cung mà thay vào đó trứng sẽ phát triển ở một nơi khác trong bụng. Quá trình thai này tạo ra một sản phẩm bất bình thường và không thể phát triển thành thai nhi.

Vị trí thường gặp của thai ngoài tử cung là ở mặt trong 2 vòi trứng. Đây là nơi vận chuyển trứng từ buồng trứng đến tử cung. Thai ngoài tử cung cũng có thể đính kèm ở bên ngoài tử cung, ở buồng trứng, hoặc gắn vào ruột.

Nhưng biến chứng nguy hiểm nhất của thai ngoài tử cung là xuất huyết nội (chảy máu bên trong bụng). Trong trường hợp thai ngoài tử cung nằm ở vòi trứng, khi các thành phần của thai vẫn tiếp tục phát triển bên trong vòi trứng sẽ làm nó căng lên và cui cùng sẽ vỡ ra. Điều này rất nguy hiểm vì có một động mạch lớn đi bên ngoài mai vòi trứng. Nếu động mạch này bị vỡ thì biến nhân sẽ bị chảy máu rát trầm trọng.

Thai ngoài tử cung thường đặc phát hiện ở tuần thứ 5 – 10 của thai kỳ.

NGUYÊN NHÂN

Thai ngoài tò cung xảy ra khi trống đực thò tinh vào trống thay vì tiếp tục đi xuống tòi tò cung và nó là nguyên nhân chính của nó. Trong số các mầm kinh lòi khi vào trống bò tòn thường, có số hoocmôn bị nhiễm trùng. Những yếu tố làm tăng nguy cơ có thai ngoài tò cung bao gồm:

- Vòi trống đã tăng bò nhiễm trùng trùng trống đây (viêm vòi trống) như viêm phế n phế, chlamydia và lậu.

- Trống đây có phèu thuât vùng bòng, đặc biệt là liên quan đến vòi trống, buồng trống, tò cung, vùng bòng dưới hooc rụt. (phèu thuât vùng xung quanh cổ tử cung không phải là yếu tố nguy cơ)

Dùng thuốc tránh thai để tránh thai.

- Đã tăng bò thai ngoài tò cung vào trống

Sử dụng vòng tránh thai không làm tăng nguy cơ bò thai ngoài tò cung. Tuy nhiên, một thai kỳ bình thường thì thường không có đột biến tránh thai, do đó nếu một phụ nữ mang thai mà lại đang dùng vòng tránh thai thì có几率 không tăng thai không nằm trong tử cung.

TRỊ U CHỈNG

Triệu chứng của thai ngoài tử cung cũng giống như sau: hoóc viêm phèn phò:

- Triệu chứng thường gặp nhất là đau bụng, đau vùng chậu và xuất huyết âm đạo.

Thai ngoài tử cung vẫn là một trường hợp cấp cứu thời tiết số. Nếu nghi ngờ có thai ngoài tử cung vẫn, hãy gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Những triệu chứng thường gặp của thai ngoài tử cung vẫn bao gồm:

- Hoa mắt, chóng mặt, nôn ói

- Da xanh, nhợt nhạt, lú nh.

- Đột quỵ

Mách nhanh (trên 100 lần/phút)

Đau bụng hooc đau vùng chậu dữ dội đột ngột không thể dừng lên được.

KHI NÀO CẦN ĐI NƠI CAN THIỆP Y KHOA

Nếu bạn có thai và cảm thấy đau bụng dữ dội cách biệt thường hooc chảy máu âm đạo, hãy đi

khám bác sĩ ngay. Nếu bạn không thể liên lạc được với bác sĩ hoặc không có thời gian chờ đợi nên nên nhanh chóng đến phòng cấp cứu bệnh viện ngay.

Bạn phải đi đến phòng cấp cứu bệnh viện ngay nếu như có những triệu chứng sau:

- Đau bụng dữ dội

- Ra huyết âm đạo nhiều

- Ngất xỉu

- Chóng mặt khi đứng dậy

- Không thể liên lạc được với bác sĩ

KHÁM & XÉT NGHIỆM

Bác sĩ của bạn hay các bác sĩ ở phòng cấp cứu có thể cần phải xác định xem bạn có thai không mang thai hay không nếu điều này chưa được xác định trước đó.

Nếu bạn bị đau nồng nàn hoặc chảy máu âm đạo nhiều, cần phải thiết lập đính truyền tĩnh mạch, cho oxy và xét nghiệm máu.

Bác sĩ sẽ khám khung chung của bạn.

Có thể phác siêu âm vùng chung để xác định vị trí thai. Siêu âm là một phương tiện chính để đoán hình ảnh sử dụng sóng âm, nó không gây đau đớn và đặc biệt hữu ích trong cách điều điều kiện kinh nghiệm với màn hình TV lên phản ứng dễ dàng.

siêu âm

Khác có khả năng phát hiện bệnh thường là

siêu âm

qua đường âm đạo (một loài điều khiển đặc biệt sẽ đưa vào bên trong âm đạo của bạn).
-

Nếu bạn nhân bao gồm máu đón mực để đưa sang, có thể cần phải đưa đến phòng mổ ngay lập tức.

Đôi khi, thai nhi chưa phát triển đến mức có thể nhìn thấy trên siêu âm. Nếu không thấy máu chảy và mực đã chảy ra ngoài, bác sĩ có thể khuyên bạn nên thử hiện một xét nghiệm máu chuyên biệt mỗi 2-3 ngày để theo dõi thai kỳ cho đến khi nó phát triển đến mức có thể nhìn thấy được. Và khi đó có thể sẽ phải

siêu âm

Làm như vậy để chắc chắn thai đang ở trong tử cung và phát triển bình thường.

ĐIỀU TRỊ

Thai ngoài tử cung là một thai kỳ bất thường và không phát triển đặc biệt thành một thai nhi và nó có thể để đưa sang, do đó cần phải điều trị. Bác sĩ sẽ bàn luận xem phương pháp điều trị nào là tốt nhất.

Phương pháp điều trị phổ biến là kích thích và vỡ túi thai ngoài tử cung

Thuật

Nếu thai ngoài tử cung nở mồi vòi trứng và có kích thước nhỏ, bạn có thể điều trị cho thuỷ cung để ngăn chặn phát triển của thai và cho phép cơ thể tống xuất nó ra ngoài. Hầu hết những phương pháp điều trị theo phong pháp này đều bao gồm điều trị là ngày đầu và [xuất huyết âm đạo](#).

Ví dụ, máu nhỉu hiện có kinh một chút. Bạn sẽ điều trị máu mỗi 3 ngày để chắc chắn rằng thuỷ cung có hiệu quả.

Phẫu thuật

Nếu thai ngoài tử cung lọt hooc môn ngoài vòi trứng, hooc môn có những dấu hiệu chảy máu nhỉu bên trong bụng, chảy chấn rỗng bao gồm phôi thai thuỷ. Loại phẫu thuật thường điều trị chấn là phẫu thuật nội soi (rách nhỉu để lấy nhỉu trên bụng để lấy thai ra) nhưng thường cũng cần phẫu thuật nội soi để lấy nhỉu. Trong trường hợp thai ở vòi trứng, nếu vòi trứng không vỡ thì đôi khi nội soi có thể lấy thai và giữ nguyên vòi trứng. Tuy nhiên thường trong trường hợp này vòi trứng đã bị tổn thương rõ rệt do đó cần phải bỏ cắt bỏ.

CÁC BỘ C TÍP THEO

Dù điều điều trị bụng thuỷ cung hay phẫu thuật trong lúc cấp cứu, bạn đều cần phải tái khám thường xuyên. Bạn sẽ điều trị khuyên làm những xét nghiệm máu để chắc chắn rằng thai ngoài tử cung đã điều trị hoàn toàn.

Phòng ngừa

Cách phòng ngừa thai ngoài tử cung tốt nhất là làm giảm các yếu tố nguy cơ

Nếu bạn điều trị chẩn đoán là viêm phổi phế, hãy uống kháng sinh theo toa của bác sĩ cho đến

khi hết bệnh và tiếp tục tái khám để bảo đảm rằng mình đã được chữa khỏi.

Tránh không mắc bệnh lậu, chlamydia và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác bằng cách sử dụng màng ngăn hay mũ trùm cổ tử cung hoặc yêu cầu bạn tình sử dụng bao cao su.

Nếu bạn đang có thai và đang sử dụng vòng tránh thai, hãy trao đổi với bác sĩ về điều này.

Phẫu thuật để sinh đẻ, ruột hoặc vùng bụng dưới có thể đâm lỗ sẹo, làm tăng nguy cơ có thai ngoài tử cung.

Tiên lâm

Khả năng bình thường sau thai ngoài tử cung rất thường nếu điều trị sớm. Bởi thai ngoài tử cung ở lần đầu có thể làm tăng nguy cơ tái diễn trong những lần mang thai sau. Bạn hãy nói với bác sĩ về ý định của bạn về những lần sinh con trong tương lai và hãy hỏi về những nguy cơ có thai ngoài tử cung trong những lần mang thai kế tiếp. Nếu bạn tiếp tục mang thai, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để có thể thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm ngăn chặn các chấn thương thai cảng bên trong tử cung.

Theo emedicinehealth – Y học NETech