



Xuất huyết âm đạo bao giờ luôn là vấn đề của phái nữ bất kể giai đoạn nào trong cuộc đời.
Xuất huyết ngoài chu kỳ kinh hooc thường chỉ xuất huyết nhẹ
t cách bất thường

trong giai đoạn hành kinh đều có thể là dấu hiệu đáng báo động. ... Thuật ngữ y học
dùng để

miêu tả xuất huyết âm đạo nhẹ

hooc

kéo dài trong giai đoạn hành kinh là rong kinh
(menorrhagia)

Bảng

xuất huyết

(metrorrhagia)

là thuật ngữ

dùng để

miêu tả

sự

xuất huyết

của tử cung vào những khoảng không đùa nhau, đặc biệt là giữa các chu kỳ kinh

. Đa kinh kéo dài (menometrorrhagia) là sự kết hợp của cả 2 hiện tượng trên, có nghĩa là xuất huyết từ tử cung nhiều và持续不断的出血 during the menstrual cycle.

Điều quan trọng là cần phải hiểu chính xác nguyên nhân chảy máu, nếu chảy máu (có thể là âm đạo, tử cung hoặc những cơ quan

hay các

mô khác)

và

quyết định nhenting phuong pháp

kiểm soát

hỗc làm

ngenting chay

máu.

- Một chu kỳ kinh bình thường có a phón bao gồm những chuỗi hỗn động phoc tố p của

hormon. Trong rong ra từ buồng tròng, sau đó tròng có thể đặc biệt tinh

vai tinh trùng và bám vào tử cung

hỗc

lộp niêm mạc

tử cung

sẽ bò tróc ra

mỗi tháng

trong

chu kỳ kinh.

Hiện tượng này gây xuất huyết trong những chu kỳ kinh bình thường.

- Một kỳ kinh bình thường dao động từ 21 đến 35 ngày nhưng thường là 28 ngày.

- Giai đoạn hành kinh thường kéo dài từ 2 đến 7 ngày và trong lộng máu và dịch menses đi kèm

vào

khoảng từ 2 đến 8 mu

ng

canh (trung bình khoảng 5 mu

ng

canh) thường là vào ngày

sẽ lộng băng vệ sinh bò tham gia

khoảng

từ

8

băng tròn xuất hiện

và

sẽ ngày chảy máu nhiu là từ 2 ngày tròn xuất hiện.

Theo emedicinehealth - Y học NET dịch